whitenessHP BLUE CALCIUM

Clareador dental para dentes vitais
Somente Uso Profissional

Leia com atenção todas as informações desta bula antes de utilizar o produto. Guarde-a para consulta, no mínimo, até total consumo do produto e não haver mais interação do produto com seu último paciente.

Descrição do Produto
Whiteness HP Blue é um produto que reúne a tecnologia dos melhores clareadores dentais e as novas tendências da odontologia mundial em termos de técnicas conservadoras e seguras para clareamento em consultório. Trata-se de um clareador à base de Peróxido de Hidrogênio a 20% e 35%. Sua formulação é baseada no seu precursor, o clareador Whiteness HP Maxx, com mudança no seu protocolo de utilização e alguns diferenciais de composição que o tornaram mais eficaz mesmo com menor concentração de peróxido. O produto Whiteness HP Blue possui, além da formulação básica do clareador Whiteness HP Maxx, Cálcio para minimizar a redução da microdureza do esmalte decorrente do clareamento, uma nova composição ativadora para potencializar seu desempenho e um novo corante azul que não altera sua cor ao longo do processo e facilita o controle visual de sua aplicação. Com relação ao seu protocolo de utilização, o produto não necessita de aceleração externa com fontes de luz (fotopolimerizador, laser, lâmpadas de plasma, etc.) e a aplicação do gel é única ao longo da sessão (40 minutos na concentração de 35% e 50 minutos na concentração de 20%). O produto conta também com uma nova apresentação, com a qual é possível preparar uma dose de gel suficiente para as duas arcadas dentais e sua aplicação é feita diretamente a partir de uma seringa. Por questões de estabilidade e potencial catalítico, o produto continua mantendo a fase Espessante separada da fase Peróxido e estas são misturadas somente no momento do uso. Para proporcionar mais segurança ao processo e ao usuário, acompanha o Kit uma solução para neutralizar o Peróxido de Hidrogênio em caso de contato acidental com tecidos moles. Trata-se de uma solução contendo 1,25% de enzima Catalase estabilizada em uma composição solvente especial. Esta solução é atóxica e decompõe o peróxido de Hidrogênio muito rapidamente, eliminando sua ação sobre os tecidos moles. Sua ação, entretanto, se restringe a neutralizar o peróxido e evitar a continuidade de sua ação. Os danos já causados pelo peróxido não conseguem ser revertidos por esta solução.

Indicação do Produto
Da mesma forma que o seu antecessor, Whiteness HP Blue deve ser utilizado exclusivamente em consultório, por profissionais habilitados, sempre com a utilização de um eficiente isolamento para a proteção dos tecidos intra-orais.
O produto é indicado nos seguintes casos:
·Dentes Vitais naturalmente escuros ou amarelados
·Dentes Vitais escurecidos pela idade
·Dentes Vitais que se apresentam escurecidos ou manchados por substâncias extrínsecas como pigmentos de café, tabaco, chá, etc.
·Em casos mais desafiadores (escurecimento severo) pode ser utilizado em combinação com a técnica caseira.
A versão HP Blue 20% é mais indicada para clareamento de dentes jovens e com manchamentos considerados de mais fácil remoção. Esta versão também segue uma tendência de busca por maior segurança no clareamento de dentes vitais em consultório. Por ser de concentração mais baixa, apresenta menor índice de sensibilidade sendo, portanto, a melhor opção para dentes mais sensíveis.
A versão HP Blue 35% é indicada para os casos de manchamento mais intensos em dentes mais mineralizados, como é o caso em pessoas de mais idade.
Nota: é importante observar que a literatura mundial demonstra que o clareamento de consultório pode apresentar menor intensidade de clareamento e eventual menor estabilidade de cor (manutenção da cor ao longo do tempo) que a técnica caseira, pois o tempo de contato do clareador com a estrutura dental é maior e mais freqüente. Dados da literatura informam que a técnica combinada oferece resultados bastante satisfatórios em se tratando de casos resistentes. Por esta razão, é necessário que haja uma perfeita interação profissional/paciente no tocante à esclarecimentos sobre resultados, com embasamento em fotos clínicas e escala de cores. É importante, ainda, que o profissional esclareça ao paciente que seus dentes possuem um grau de saturação, sendo que em muitos casos o paciente terá seus dentes clareados embora não ao nível idealizado pelo mesmo.

Em relação a hipersensibilidade, deve-se notar que o clareamento em consultório, por apresentar maior concentração de peróxido, pode apresentar maior hipersensibilidade dental durante e/ou após o procedimento do que peróxidos de menor concentração como os de uso caseiro.

Composição Básica
Ingredientes ativos: Peróxido de Hidrogênio a 20% ou 35% (após mistura das fases)
Ingredientes inativos: Espessantes, Pigmento inerte Azul (HP Blue 20%) ou Pigmento inerte Violeta (HP Blue 35%), agentes neutralizantes, Gluconato de Cálcio, Glicol e água Deionizada.

Formas de apresentação
Whiteness HP Blue - Kit (6 aplicações):
06 conjuntos de seringas (1,2g por conjunto, 7,2g de gel no total)
01 frasco com 2g de Neutralize
01 seringa de top dam com 2g e 6 ponteiras (Reg. ANVISA 80172310023).
06 dispositivos de acoplamento das seringas
06 ponteiras para aplicação do gel
Manual de Instruções para o profisional.

Whiteness HP Blue – Mini Kit (2 aplicações):
02 Conjuntos de seringas (1,2g por conjunto, 2,4g de gel no total)
01 seringa de top dam com 1g e 2 ponteiras (Reg. ANVISA 80172310023)
02 dispositivos de acoplamento das seringas
02 ponteiras para aplicação do gel
Manual de Instruções para o profissional.

Precauções e Contra-Indicações
·O produto é de uso exclusivo em consultório e deve ser manipulado somente por cirurgiões-dentistas.
·A saúde da cavidade bucal deve ser avaliada previamente ao tratamento. Fissuras no esmalte, infiltrações em eventuais restaurações, dentina exposta e outros fatores que possam comprometer o clareamento devem ser solucionadas antes de se iniciar o tratamento. O produto é contra-indicado para pacientes em mau estado de saúde bucal.
·Trincas no esmalte dental são bastante comuns mas geralmente não impedem o clareamento, embora possam ocorrer casos com dores agudas causadas por infiltração demasiado rápida do peróxido na estrutura dental através de trincas. Geralmente este efeito é caracterizado por dor aguda em elementos isolados. Caso o paciente apresente trincas no esmalte mantenha atenção dobrada sobre esta possibilidade, uma vez que não se pode predeterminar a profundidade da trinca. Caso ocorra hipersensibilidade de maneira muito intensa, aplique um agente dessensibilizante (Desensibilize KF 2%) durante 10 minutos. Ainda, se esta conduta não for eficaz, considere diminuir o tempo de aplicação do clareador de consultório, complementando com a técnica caseira.
·O produto não é indicado para clareamento de dentes com Amelogênese e dentinogênese imperfeita, fluorose severa, manchamentos intensos por tetraciclina e outras anomalias de esmalte e dentina que coloquem em risco a vitalidade do dente.
·O produto não é indicado para uso sob anestesia do paciente. É importante que se tenha o monitoramento da sensibilidade sentida pelo paciente durante o clareamento. Em casos extremos em que se tenha alguma imperfeição ou falha da estrutura dental de tal forma que o peróxido possa chegar à polpa dental em maior quantidade, pode ocorrer morte pulpar.
·O produto não é indicado para clareamento em gestantes, lactantes e pacientes menores de 15 anos.
·O produto não é recomendado para pessoas que tenham feito recentemente cirurgia de gengiva ou com inflamação do tecido gengival e pessoas com reações alérgicas ao produto.
·Por ser um produto auto-catalisado é desnecessário o uso de fontes de luz aceleradoras (sistemas de LED, LASERs de alta potência e outros).
·Condicionamento ácido do esmalte dental previamente ao clareamento não é necessário e nem recomendado.
·Durante a manipulação do produto, tanto o profissional quanto auxiliar devem usar luvas e óculos de proteção. O paciente deve também utilizar óculos de proteção e outras eventuais proteções necessárias para evitar contato acidental do produto com a pele e roupas.

·Whiteness HP Blue é um clareador com alto poder oxidante e quando em contato com o tecido vivo, pode causar um manchamento branco e irritação temporária da região afetada (geralmente desaparece em no máximo 2 horas, sem qualquer seqüela).
·Em caso de contato acidental com a pele ou tecidos vivos intra-orais, neutralize o peróxido cobrindo a região com algumas gotas da solução Neutralizadora e lave-a em seguida.
·O clareador é composto por uma fase chamada Peróxido (fase 1) e outra chamada Espessante (fase 2), as quais deverão ser misturadas no momento do uso. Cuidado deve ser tomado ao se manipular a fase peróxido, pois esta contém peróxido de Hidrogênio a 30% (para o HP Blue 20%) e 50% (para o HP Blue 35%).
·O conteúdo das seringas com peróxido pode estar sob pressão e/ou pode ter vazado devido a condições adversas de estocagem. Antes de abrir a embalagem proteja suas mãos e olhos (cirurgião dentista e auxiliar) e observe se não há líquido vazado em seu interior. Caso constate vazamento solicite a troca do material.
·Proceda a manipulação do produto longe do paciente, sobre uma pia ou espaço seguro e sem riscos de contaminar outras pessoas.
·Após o uso do produto lave bem as mãos e materiais contaminados com peróxido. Pense em prevenção e segurança quando estiver manipulando o produto.
·Faça um eficiente isolamento do tecido gengival utilizando o protetor gengival fotopolimerizável Top Dam ou dique de borracha associado a um afastador labial. Em todos os casos é fundamental que se evite o contato do peróxido com os tecidos intra-orais.
·Deve-se recomendar ao paciente que evite a ingestão de alimentos ácidos e/ou fortemente corados por pelo menos 24 horas após o clareamento para evitar sensibilidade e possível comprometimento do clareamento.
·Informe o paciente sobre as possibilidades de sucesso e insucesso no clareamento. Previna a possibilidade de frustrar a expectativa do paciente.
·Após a mistura das fases, insira a ponteira e verifique se não há resistência para a liberação do gel clareador antes de aplicar nos dentes do paciente. Se houver resistência, troque a ponteira e teste em uma superfície (por exemplo, bloco de mistura).
·O produto deve ser utilizado conforme recomendado em seu protocolo. Não deve ser injetado em hipótese alguma.

Efeitos colaterais
·Alguns pacientes podem experimentar sensibilidade dental durante ou após o clareamento. Se o paciente apresentar sensibilidade durante o tratamento, interrompa o clareamento e trate os dentes com o dessensibilizante Desensibilize KF 2%. Se a sensibilidade persistir e não for possível dar continuidade ao clareamento, marque nova sessão com um intervalo mínimo de 7 dias. Avalie se não há alguma anomalia nos dentes que possa ser corrigida para eliminar tal sensibilidade. Há casos em que a sensibilidade aparece somente após o tratamento (1 ou 2 horas após). Nestes casos, se a sensibilidade for alta, recomenda-se prescrever um analgésico e, eventualmente um anti-inflamatório, conforme necessidade de cada caso.
·O clareamento pode realçar áreas de hipocalcificação (hipoplasias) pré-existentes devido ao diferente comportamento de clareamento (mais intenso) destas áreas. Em alguns casos essas manchas desaparecem devido à desidratação do esmalte após a conclusão do clareamento. O tratamento com flúor dessas regiões também pode auxiliar no seu desaparecimento.

Instruções de Uso
Antes de iniciar o tratamento leia com atenção as Advertências, Precauções, Contra-Indicações e possíveis Efeitos Colaterais.

Preparando-se para o clareamento:
1.Paramente-se (dentista e auxiliar) com seu equipamento de segurança (luvas, óculos, gorro, máscara e avental) para manipular o produto. Paramente, também, seu paciente para evitar contato indevido do gel, utilizando gorro, óculos de proteção e um adequado afastador labial (Arcflex - FGM).
2. Retire o clareador da embalagem observando as recomendações de segurança.
3. Retire a tampa da seringa com Espessante e acople o dispositivo de acoplamento entre seringas.
4. Acople a seringa com o Peróxido, tomando cuidado com o fato de que este pode estar sob pressão.
5. Guarde o conjunto para mistura no momento da aplicação. Atenção! Misture as duas seringas somente após o preparo do paciente (no momento do uso do gel). Observe que as seringas de Peróxido são exclusivas para cada Concentração e não poderão ser trocadas, isto é, o Peróxido para a concentração de 35% é exclusivo para aquela versão e não atende ao produto com 20% e vice-versa;

Clareamento de dentes Vitais
Faça uma boa avaliação da cavidade bucal do paciente; presença de cárie, restaurações deficientes, fissuras no esmalte, recessões gengivais, gengivite e outras características que se julgarem importantes devem ser verificadas e tratadas antes do procedimento. Providencie sua proteção e a do paciente.

PASSO A PASSO: Utilize a seqüência de figuras anexa para visualização do procedimento.

Fig 1. Posicione o afastador labial Arc Flex (FGM) para afastamento de lábios e bochechas.
Fig 2. Realize uma profilaxia com pedra-pomes e água.
Fig 3. Registre a cor inicial dos dentes com escala de cores e fotografe o caso inicial.
Fig 4. Aplique o Desensibilize KF2% por 10 minutos para promover uma dessensibilização prévia. Remova o excesso de gel com ponta aspiradora, em seguida lave e seque.
Fig 5. Faça o isolamento relativo com Top Dam (protetor gengival fotopolimerizável) cobrindo a gengiva marginal e as papilas com uma camada de 3 a 5 mm de largura e máximo 1 mm de espessura . A barreira deverá cobrir aproximadamente 0,5 a 1 mm da superfície dental. Utilize um espelho clínico observando de incisal para cervical e observe se há tecido gengival descoberto. Caso haja faça a correção. Esta etapa é crucial para que se evite contato do peróxido com a gengiva. Utilize um afastador labial para facilitar a aplicação da barreira e também do clareador.
Fig 6. Polimerize a resina Top Dam utilizando 20 a 30 segundos de fotopolimerização para cada grupo de 3 dentes. O protetor gengival que se forma é rígido e insolúvel, prevenindo eventual irritação por produtos agressivos.
Fig 7. Prepare o gel: misture as duas fases com as seringas conectadas, empurrando os êmbolos alternadamente por até 8 vezes, então empurre todo o conteúdo misturado para uma das seringas, estando assim pronto para uso. **Notas:** 1 - Tome cuidado para que ambas as seringas estejam bem acopladas; 2 - Faça a mistura das fases em local separado, fora do alcance do paciente;
Fig 8. Coloque uma ponteira na seringa que remanescer com o gel e aplique uma camada sobre toda a superfície vestibular dos dentes a serem clareados (incluindo as interproximais) e estenda um pouco nas faces incisal e oclusal. A camada de gel deverá ter entre 0.5 a 1mm de espessura. Considere somente a linha de sorriso (geralmente de 2º Pré-molar a 2º Pré-molar do outro arco).
Nota: Uma seringa com 1,2g de gel rende o suficiente para uma aplicação simultânea nos dois arcos.
Fig 9. Deixe o gel permanecer sobre a superfície dental pelos seguintes períodos: 40 minutos para o HP Blue 35% e 50 minutos para o HP Blue 20%, com aplicação única do gel durante a sessão para as duas versões. Com o auxílio de um microaplicador Cavibrush movimente o gel sobre os dentes frequentemente (a cada 5 ou 10 minutos) para liberar eventuais bolhas de oxigênio geradas e renovar o contato do gel com os dentes.
Nota: Os tempos de aplicação dos clareadores são sugestões e devem ser administrados pelo Profissional. Tempos mais curtos ou interrupção do tratamento podem ocorrer em casos de hipersensibilidade dental.
Fig 10. Ao final do tratamento, aspire o gel com uma cânula endodôntica ou cirúrgica e lave os dentes com água em abundância. Remova o protetor gengival destacando-o com uma sonda exploradora.
Fig 11. Faça o polimento dos dentes com pasta de polimento Diamond Excel e discos de feltro Diamond ou Diamond Flex.
Notas importantes

1. Monitore o paciente ao longo de todo o clareamento com relação à sensibilidade dental e possíveis pontos de irritação por contato com peróxido. Caso haja algum destes casos, interrompa o processo e faça uma verificação e intervenção (veja comentários na seção de Precauções e Efeitos Colaterais).
2. Caso o paciente desenvolva hipersensibilidade que não consiga ser controlada, sugere-se interromper o tratamento e verificar se não há anomalia na estrutura dental que possa ser causadora da hipersensibilidade (fissuras, exposição de dentina, etc.). Quando a sensibilidade for de difícil controle ou então, por alguma razão, nova sessão de clareamento não for possível ou não recomendada, pode-se então complementar o clareamento utilizando clareadores de uso caseiro (Whiteness Perfect 10%, por exemplo).
3. Em casos onde as duas sessões de clareamento preconizadas não resultarem em um nível satisfatório de clareamento (casos de manchamentos mais severos), pode-se estender o tratamento por mais duas sessões, desde que o paciente não apresente hipersensibilidade. Neste caso, deve respeitar-se um intervalo de sete dias entre sessões. Para casos ainda mais desafiadores, uma combinação de clareadores (consultório e caseiro) pode ser indicada de acordo com parâmetros estabelecidos pelo profissional.
4. Resultados satisfatórios podem ocorrer já na primeira sessão. No entanto, é recomendado que se faça mais uma sessão para efeitos de maior eficácia do tratamento (2 sessões por paciente).
5. Da mesma forma que com as demais técnicas de clareamento, o registro da cor dos dentes antes do tratamento, o esclarecimento do paciente sobre as reais perspectivas do seu caso (limitações nos casos de manchamento por tetraciclina, coloração acinzentada, etc.), aviso sobre possível sensibilidade, necessidade de troca de restaurações, são recomendados. Há casos em que, por características particulares dos dentes (características do esmalte, tipo de pigmentação, etc.), o nível de clareamento desejado pode não ser possível de se obter.
6. Uma vez feita mistura do clareador, este deverá ser consumido na mesma sessão. O gel não pode ser armazenado para uso em outra sessão após a sua manipulação, pois perderá sua eficácia. Caso ocorra sobra de gel durante a sessão, este deverá ser descartado (diluído com água e descartado na pia, por exemplo).

Conservação e Armazenamento
·Produto de uso Profissional.
·Deve ser utilizado somente por profissionais habilitados.
·Não utilize o produto se este estiver fora do prazo de validade.
·Para descarte do produto siga a legislação de seu país.
·Armazene o produto em temperaturas entre 5 e 25 °C para melhor conservação.
·Não congelar o produto.
·Proteger da incidência da luz solar direta.

Advertências
Não utilizar o produto se este estiver fora do prazo de validade. Para o descarte do produto siga a legislação de seu país. Manter fora do alcance de Crianças.

Fabricado por:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 – Joinville – SC
Fone: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
Autorização de Funcionamento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Registro na ANVISA n° 8 0 1 7 2 3 1 0 0 4 0
Responsável Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ.: 13100147-SC

Atendimento ao Profissional:
+ 55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

EC REP Cinterqual

Av. Ressano Garcia,41 - 1º F
1070234 Lisboa Portugal
Fone: +351 21 3867321

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no es responsable por daños causados por otros usos o por manipulación incorrecta. Además de esto, el usuario está obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por eso, no poseen cualquier vínculo.

Rev: 00

whitenessHP BLUE CALCIUM

Sistema de Blanqueamiento Dental
Profesional

Blanqueador Dental para uso en Consultorio
Solamente Uso Profesional

Descripción del Producto
Whiteness HP Blue es un producto que reúne la tecnología de los mejores blanqueadores dentales y las nuevas tendencias de la odontología mundial en términos de técnicas conservadoras y seguras para el blanqueamiento en consultorio. Se trata de un blanqueador a base de Peróxido de Hidrógeno al 20% y al 35%. Su formula se basa en su precursor, el blanqueador Whiteness HP Maxx, con cambios en su protocolo de utilización y algunos diferenciales de composición que lo tornaron más eficaz aunque con menor concentración de peróxido. El producto Whitenes Hp Blue además de la fórmula básica del blanqueador Whteness HP Maxx, posee Calcio para minimizar la reducción de la micro dureza del esmalte provocada por el blanqueamiento, una nueva composición activadora para potencializar su desempeño y un nuevo colorante azul que no altera su color a lo largo del proceso y facilita el control visual de su aplicación. Con relación a su protocolo de utilización, el producto no necesita de aceleración externa con fuentes de luz (foto polimerizador, láser, lámparas de plasma, etc.) y la aplicación del gel es única a lo largo de la sesión (40 minutos en la concentración de 35% y 50 minutos en la concentración de 20%). El producto cuenta también con una nueva presentación, con la cual es posible preparar una dosis de gel suficiente para las dos arcadas dentales y su aplicación es hecha directamente a partir de una jeringa. Por cuestiones de estabilidad y potencial catalítico, el producto continúa manteniendo la fase Espesante separada de la fase Peróxido y estas son mezcladas solamente en el momento del uso. Para proporcionar mayor seguridad al proceso y al usuario, se incluyó en el Kit una solución para neutralizar el Peróxido de Hidrógeno en caso de que ocurra contacto accidental con los tejidos blandos. Se trata de una solución contenido 1,25% de enzima Catalasa estabilizada en una composición solvente especial. Esta solución es atóxica y descompone el peróxido de Hidrógeno muy rápidamente, neutralizando su acción sobre los tejidos blandos. Entretanto su acción, se restringe a neutralizar el peróxido y evitar la continuidad de su acción. Los daños ya causados por el peróxido no consiguen ser revertidos por esta solución.

Indicación del Producto
De la misma forma que su antecesor, Whiteness HP Blue debe ser utilizado exclusivamente en consultorio, por profesionales habilitados, siempre con la utilización de un eficiente aislamiento para la protección de los tejidos intra-orales.
El producto es indicado para los siguientes casos:
·Dientes vitales oscurecidos por la edad
·Dientes vitales naturalmente oscuros o amarillos.
·Dientes vitales oscurecidos o manchados por sustancias extrínsecas como pigmentos de café, té, tabaco etc.
·En casos más desafiadores (oscurecimiento severo) puede ser utilizado en combinación con la técnica casera.
La versión HP Blue 20% es más indicada para el blanqueamiento de dientes jóvenes y con manchas consideradas de más fácil remoción. Esta versión también sigue una tendencia de búsqueda por mayor seguridad en el blanqueamiento de dientes vitales en consultorio. Por ser de concentración más baja, presenta menor índice de sensibilidad siendo, la mejor opción para dientes más sensibles.
La versión HP Blue 35% es indicada para los casos de manchas más intensas en dientes más mineralizados, como es el caso de personas de mayor edad.
Nota: es importante observar que la literatura mundial demuestra que el blanqueamiento de consultorio puede presentar menor intensidad de blanqueamiento y eventual menor estabilidad de color (manutención del color a lo largo del tiempo) que la técnica casera, porque el tiempo de contacto del blanqueador con la estructura dental es mayor y más frecuente. Datos de la literatura informan que la técnica combinada ofrece resultados bastante satisfactorios cuando se trata de casos resistentes. Por esta razón, es necesario que halla una perfecta interacción profesional/paciente en lo que se refiere a esclarecimientos sobre resultados, con base en fotos clínicas y escala de color. Además es importante, que el profesional esclarezca al paciente que sus dientes poseen un grado de saturación, siendo que en muchos casos el paciente tendrá sus dientes blanqueados aunque no al nivel idealizado por el mismo.

En relación a la hipersensibilidad, se debe notar que el blanqueamiento en consultorio, por presentar mayor concentración de peróxido, puede provocar mayor hipersensibilidad dental durante y/o después del procedimiento que los peróxidos de menor concentración como los de uso casero.

Composición Básica
Ingredientes activos: Peróxido de Hidrógeno al 20% o 35% (tras la mezcla de las fases)
Ingredientes inactivos: Espesantes, Pigmento inerte Azul (HP Blue 20%) o pigmento violeta (HP Blue 35%), agentes neutralizantes, Gluconato de Calcio, Glicol y agua Desonzada.

Formas de presentación
Whiteness HP Blue - Kit (6 aplicaciones):
06 conjuntos de jeringas (1,2g por conjunto, total 7,2g de gel)
01 frasco con 2g de Solución Neutralizante de Peróxido
01 jeringa de top dam con 2g y 6 punteras (Reg. ANVISA 80172310023).
06 dispositivos para acoplar las jeringas
06 punteras para aplicación del gel
Manual de Instrucciones para el profesional.

Whiteness HP Blue – Mini Kit (2 aplicaciones):
02 Conjuntos de jeringas (1,2g por conjunto, total 2,4g de gel)
01 jeringa de top dam con 1g y 2 punteras (Reg. ANVISA 80172310023)
02 dispositivos para acoplar las jeringas
02 punteros para aplicación del gel
Manual de Instrucciones para el profesional.

Precauciones y Contraindicaciones
·El producto es para uso exclusivo en consultorio y debe ser manipulado solamente por odontologos.
·La salud de la cavidad bucal debe ser evaluada previamente al tratamiento. Fisuras en el esmalte, infiltraciones en eventuales restauraciones, dentina expuesta y otros factores que puedan comprometer el tratamiento de blanqueamiento deben ser solucionadas antes de iniciarse el tratamiento. El producto es contra indicado para pacientes con mal estado de salud bucal.
El producto está contraindicado para pacientes que no puedan solucionar los problemas descritos anteriormente.
·El producto no está indicado para blanqueamiento de dientes con Amelogénesis y dentinogénesis imperfecta, fluorosis severa, manchas intensas por tetraciclina y otras anomalías de esmalte y dentina que coloquen en riesgo la vitalidad del diente.
·Las trincas en el esmalte son bastante comunes aunque generalmente no impiden el blanqueamiento, sin embargo pueden ocurrir casos con dolores agudos causadas por infiltración demasiado rápida del peróxido en la estructura dental a través de las trincas. Generalmente este efecto se caracteriza por un dolor agudo en elementos aislados. Caso el paciente presente trincas en el esmalte mantenga el doble de atención a esta posibilidad, una vez que no se puede predeterminar la profundidad de la trinca. Caso ocurra hipersensibilidad de manera muy intensa, aplique un agente desensibilizante (Desensibilize KF 2%) durante 10 minutos. Caso esta conducta no sea eficaz, considere la disminución del tiempo de aplicación del blanqueador de consultorio, complementando con la técnica casera.
·El producto no está indicado para el uso del paciente bajo anestesia. Es importante que se realice el monitoreo de la sensibilidad sentida por el paciente durante el blanqueamiento. En casos extremos, en los que se tenga alguna imperfección o falla en la estructura dental de tal forma que el peróxido pueda llegar a la pulpa dental en mayor cantidad, puede desencadenar muerte pulpar.
·El producto no está indicado para blanqueamiento en gestantes, lactantes y pacientes menores de 15 años.
·El producto no es recomendado para personas sometidas recientemente cirugía periodontal, gingivitis o periodontitis y personas con reacciones alérgicas al producto.
·Por ser un producto auto catalizado es innecesario el uso de fuentes de luz aceleradoras (sistemas de LED, Láser de alta potencia y otros)

No se recomienda y tampoco es necesario grabado ácido del esmalte dental previo al blanqueamiento.
·Durante la manipulación del producto, tanto el profesional como el auxiliar, deben usar guantes y anteojos de protección. El paciente debe también utilizar anteojos de protección y otras eventuales protecciones necesarias para evitar el contacto accidental del producto con la piel y las ropas.
·Whiteness HP Blue es un blanqueador con alto poder oxidante y cuando entra en contacto con el tejido vivo, puede causar unas manchas blancas e irritación temporal de la región afectada (generalmente desaparece en lo máximo 2 horas, sin cualquier secuela).
·En caso de contacto accidental con la piel o tejidos vivos intra orales, neutralice el peróxido cubriendo la región con algunas gotas de la solución Neutralizante y lávela enseguida.
·El blanqueador está compuesto por una fase llamada Peróxido (fase 1) y otra llamada Espesante (fase 2), las cuales deberán ser mezcladas antes del uso. Debe tomarse cuidado al manipularse la fase peróxido, pues ésta contiene peróxido de Hidrógeno al 30% (para el HP Blue 20%) y al 50% (para el HP Blue 35%)
·El contenido de las jeringas con peróxido puede estar bajo presión o con pérdidas, debido a condiciones adversas de almacenaje. Antes de abrir el envase proteja sus manos y ojos y observe si no hay líquido perdido en su interior. En el caso de constatarse pérdida, solicite el cambio del material.
·Proceda a la manipulación del producto lejos del paciente, sobre una pileta o espacio seguro y sin riesgos de contaminar otras personas.
·Después de la utilización del producto, lave bien las manos y los materiales contaminados con peróxido. Piense en prevención y seguridad, cuando esté manipulando el producto.
·Haga un eficiente aislamiento del tejido gingival, utilizando el protector gingival fotopolimerizable Top Dam o dique de goma asociado a un apartador labial. En todos los casos es fundamental que se evite el contacto del peróxido con los tejidos intra orales.
·Se debe recomendar al paciente que evite la ingestión de alimentos ácidos y/o fuertemente colorados por lo menos por 24 horas después del blanqueamiento para evitar sensibilidad y posible compromiso del blanqueamiento.
·Informe al paciente sobre las posibilidades de éxito y fracaso en el blanqueamiento. Prevenga la posibilidad de frustrar la expectativa del paciente.
·Tras la mezcla de las fases, inserte la puntera y verifique si no hay resistencia para la liberación del gel blanqueador antes de aplicarlo en los dientes del paciente. Si existe resistencia, cambie la puntera y haga una prueba en una superficie (por ejemplo, placa de mezcla).
·El producto debe ser utilizado conforme recomendado en su protocolo. Nunca debe ser inyectado.

Efectos colaterales
·Algunos pacientes pueden presentar sensibilidad dental durante o después del blanqueamiento. Si el paciente presenta sensibilidad durante el tratamiento, interrumpa el blanqueamiento y trate los dientes con el desensibilizante Desensibilize KF 2%. Si la sensibilidad persiste y no es posible continuar el blanqueamiento, marque una nueva sesión con un intervalo mínimo de 7 días. Evalúe si no hay alguna anomalía en los dientes que pueda ser corregida para eliminar tal sensibilidad. Existen casos en los que la sensibilidad aparece solamente después del tratamiento (1 o 2 horas después). En estos casos, si la sensibilidad fuera alta, se recomienda recetar un analgésico y, eventualmente un anti-inflamatorio, según la necesidad de cada caso.
·El blanqueamiento puede realzar áreas de hipo calcificación (hipoplasias) preexistentes debido al comportamiento diferente del blanqueamiento (más intenso) de estas áreas. En algunos casos esas manchas desaparecen debido a la deshidratación del esmalte tras la conclusión del blanqueamiento. El tratamiento con flúor de esas regiones también puede auxiliar en su desaparición.

Instrucciones de Uso
Antes de iniciar el tratamiento lea con atención las Advertencias, Precauciones, Contraindicaciones y posibles Efectos Colaterales.

Preparándose para el blanqueamiento:

DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Barrio: Distrito Industrial
89219-501 – Joinville – SC
Tel: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
Autorización de Funcionamiento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06

INDUSTRIA BRASILEÑA

Registro en ANVISA n° 80172310040
Responsable Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ.: 13100147-SC
Marca:
FGM PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Atención al Profesional:
+ 55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

Cinterqual

Av. Ressano Garcia,41 - 1º F
1070234 Lisboa Portugal
Fono: +351 21 3867321

EC REP

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza por daños causados por otros usos o por manipulación indebida. Además, el usuario está obligado a comprobar, antes de su utilización y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando la utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por esto, no poseen cualquier vínculo.

Sistema de Clareamento Dental
Profissional